

## Recovering from Post-Traumatic Stress Disorder symptoms: A study on the combination of art and mindfulness

**Kheirollah Sadeghi<sup>1</sup>, Golfam Goodarzi<sup>2</sup>, Aliakbar Foroughi<sup>3</sup>**

1-Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

2- MSc, Department of Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran (Corresponding Author). E-mail: [Golfamgoodarzi@yahoo.com](mailto:Golfamgoodarzi@yahoo.com)

3- Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

**Received:** 01/09/2022

**Accepted:** 27/11/2022

### Abstract

**Introduction:** Even though sexual assault is rarely considered a serious social problem; it can lead to severe mental-health consequences.

**Aim:** The aim of the current study was to assess the attrition rates and the effectiveness of a therapeutic program of art and mindfulness on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in female sexual assault survivors.

**Method:** This study was a controlled clinical trial with a design of pre-test, post-test, and a two-month follow-up. The population included women with sexual assault experience that had sought professional help in the psychotherapy clinics of Hamedan in 2019. 16 individuals were first selected using purposive sampling and then were allocated randomly to control (N=8) and experimental groups (N=8). The utilized questionnaires included the Impact-of-Event-Scale (2007) and the Depression-Anxiety-Stress-Scale-21 (1995). The combined treatment of art and mindfulness was conducted for the experimental group through eight two-hour weekly sessions. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics, one-way ANCOVA and SPSS software-version 22.

**Results:** Findings indicated that the combined art and mindfulness therapeutic program reduced intrusion ( $F=20.34$ ,  $P<0.001$ ), arousal ( $F=20.43$ ,  $P<0.001$ ), avoidance ( $F=14.32$ ,  $P<0.002$ ), and stress scores ( $F=33.46$ ,  $P<0.001$ ) significantly in the experimental group.

**Conclusion:** The findings indicated that the combined art therapy and mindfulness method could play a significant role in the alleviation of PTSD symptoms in sexually traumatized individuals. It is suggested that the therapists consider this intervention for individuals that are severely afraid of their trauma-related memories.

**Keywords:** Art therapy, Mindfulness, Post-traumatic stress disorder, Sexual assault

---

**How to cite this article:** Sadeghi Kh, Goodarzi G, Foroughi A. Recovering from Post-Traumatic Stress Disorder symptoms: A study on the combination of art and mindfulness. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2023; 9 (6): 131-145. URL: <https://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1423-en.pdf>

## راهی از علائم استرس پس از سانحه: مطالعه‌ای بر ترکیب هنر و ذهن‌آگاهی

خیر الله صادقی<sup>۱</sup>، گلفام گودرزی<sup>۲</sup>، علی اکبر فروغی<sup>۳</sup>

۱. دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

۲. کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (مؤلف مسئول). ایمیل: Golfamgoodarzi@yahoo.com

۳. استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

### چکیده

**مقدمه:** اگرچه آزار جنسی کمتر به عنوان یک آسیب اجتماعی جدی شناخته می‌شود، می‌تواند عواقب شدیدی برای سلامت روان داشته باشد.

**هدف:** هدف پژوهش حاضر بررسی نرخ ریزش و اثربخشی درمان هنر و ذهن‌آگاهی بر استرس پس از سانحه در آزاردیدگان جنسی بود.

**روش:** پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی کنترل شده از نوع پیش‌آزمون-پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زن‌های آزاردیده‌ی جنسی مراجعه کننده به کلینیک‌های روان درمانی همدان در سال ۱۳۹۸ بودند که از میان آن‌ها ۱۶ نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۸ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه‌های مورد استفاده تأثیر رویداد (۲۰۰۷) و افسردگی-اضطراب-استرس (۱۹۹۵) بود. درمان هنر و ذهن‌آگاهی طی هشت جلسه هفتگی ۲ ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، به کمک تحلیل کوواریانس یک‌راهه و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۲ تحلیل شدند.

**یافته‌ها:** یافته‌ها نشان داد که درمان هنر و ذهن‌آگاهی شدت افکار مزاحم  $F=20/34$  در سطح  $0.001$ ، برانگیختگی  $F=20/43$  در سطح  $0.001$ ، اجتناب  $F=14/32$  در سطح  $0.002$  و استرس  $F=33/46$  در سطح  $0.001$  را به میزان معناداری در گروه آزمایش کاهش داد.

**نتیجه‌گیری:** نتایج نشان داد که درمان ترکیبی هنر و ذهن‌آگاهی می‌تواند نقش مهمی در بهبود استرس پس از سانحه در آزاردیدگان جنسی داشته باشد. پیشنهاد می‌شود درمانگران برای افرادی که از یادآوری تروما ترس شدیدی دارند از این مداخله استفاده نمایند.

**کلیدواژه‌ها:** هنردرمانی، ذهن‌آگاهی، استرس پس از سانحه، آزار جنسی

از انگ خوردن (مکتویان، قاسمی و هاشمیان فر، ۱۳۹۴)،<sup>۱۵</sup> لکه‌ی ننگ خانواده دانسته شدن (ون لیث، بولاك،<sup>۱۶</sup> رحیمیان و مقدم، ۲۰۱۶) و جو مرد سالار در برخی جوامع (بهبهانی، ۲۰۱۵) مانند ایران، مانع از جستجوی درمان و صحبت از این تجربه در زنان آزار دیده‌ی جنسی شده است (مکتویان و همکاران، ۱۳۹۴؛ بهبهانی، ۲۰۱۵). بعلاوه، مفاهیم اجتماعی مانند «حیا» جمعیت‌های آسیایی (کوبرن، گیل و هریسون،<sup>۱۷</sup> ۲۰۱۵) از جمله ایران (رئیسی، یحیوی، میرسپاسی، فیروز خجسته فر و شهری، ۲۰۱۸) را از صحبت راجع به موضوعات جنسی منع می‌کند.

این دلایل، صحبت در مورد آزار جنسی را برای برخی شدیداً آزار دهنده می‌کند. از سوی دیگر، دسترسی به خدمات روان‌درمانی شواهد-مدار به دلیل زیرساخت‌های ضعیف آموزشی و درمانی (کازلاسکاس<sup>۱۸</sup>، ۲۰۱۷) و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم در کشورهایی مانند ایران (آلوش، صلواتی و آلوش، ۲۰۱۹) به شدت محدود شده است. در نتیجه، مداخلات غیرکلامی، ارزان و در دسترس است؛ که مراجعه‌کنندگان را به طور تدریجی در معرض خاطرات ترومای قرار می‌دهد، که می‌تواند برای بازماندگان آزار جنسی مفید و آن‌ها را به درمان ترغیب کند.

هنردرمانی<sup>۱۹</sup> دارای ویژگی‌های مفید برای درمان استرس پس از سانحه است (کلویتر،<sup>۲۰</sup> ۲۰۱۵). مشارکت فعالانه مراجعه‌کنندگان در روند بهبود و فرصت ابراز خویش به شیوه‌های شخصی؛ حتی زمانی که مایل به صحبت نیستند، نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها هستند. انجام فعالیت‌های هنری به افراد کمک می‌کند تا افکار حال و گذشته را

#### مقدمه

مواجهه با ترومای<sup>۱</sup> از رنج آورترین وقایع محتمل در زندگی انسان است؛ و زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مسیبیش انسان دیگری باشد. یکی از تجربیات ترموماتیک بین‌فردی آزار جنسی<sup>۲</sup> است که به تماس جنسی ناخواسته گفته می‌شود (جافی، سرو و دیلیلو،<sup>۳</sup> ۲۰۲۱). خشونت جنسی<sup>۴</sup> محتمل‌ترین سبب استرس پس از سانحه<sup>۵</sup> است (کسلر، رز، کوئن، کرم، ستگ و همکاران<sup>۶</sup>، ۲۰۱۴). شیوع جهانی آزار جنسی در برخی مطالعات ۵۹٪ (دورکین، کراهی و زینزا،<sup>۷</sup> ۲۰۲۱) بود و همایندی آن با استرس پس از سانحه در ایران ۶۱٪ است (واتق رحیم پرور، متغی، دانش‌پرور و جعفری، ۱۳۹۴). درمان‌های شواهد محور (درمان شناختی رفتاری مرکز بر ترومای<sup>۸</sup> یا حساسیت‌زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد<sup>۹</sup>) علی‌رغم اثربخشی بر استرس پس از سانحه (واتکینز، اسپرنگ و روتام،<sup>۱۰</sup> ۲۰۱۸)، در برخی پژوهش‌ها دارای اثربخشی محدود (استینکمپ، لیتر و مارمر<sup>۱۱</sup>، ۲۰۲۰)، دشوار برای مشارکت به دلیل مرکز بر ترومای (کار، مورفی و اسمیت<sup>۱۲</sup>، ۲۰۱۶) یا دارای نرخ ریزش بالا (به دلیل تحریک ترس) بوده‌اند (لوئیس، رابرتز، گیسون و بیسن،<sup>۱۳</sup> ۲۰۲۰).

همچنین، ضعف حافظه در بیان کلامی خاطرات در مبتلایان استرس پس از سانحه (چونگ،<sup>۱۴</sup> ۲۰۱۵)، ترس

<sup>1</sup>- Trauma

<sup>2</sup>- Sexual assault

<sup>3</sup>- Jaffe, Cero & DiLillo

<sup>4</sup>- Sexual violence

<sup>5</sup>- Post-Traumatic Stress Disorder

<sup>6</sup>- Kessler, Rose, Koenen, Karam, Stang & et al

<sup>7</sup>- Dworkin, Krahe & Zinzow

<sup>8</sup>- Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy

<sup>9</sup>- Eye Movement Desensitization and Reprocessing

<sup>10</sup>- Watkins, Sprang & Rothbaum

<sup>11</sup>- Steenkamp, Litz & Marmar

<sup>12</sup>- Kaur, Murphy & Smith

<sup>13</sup>- Lewis, Roberts, Gibson & Bisson

<sup>14</sup>- Chong

<sup>15</sup>- Van Lith T, Bullock

<sup>16</sup>- Cowburn, Gill & Harrison

<sup>17</sup>- Kazlauskas

<sup>18</sup>- Art therapy

<sup>19</sup>- Cloitre

جمله اجتناب، در جمعیت آزاردیدگان جنسی حکایت دارند. به علاوه در پژوهش بوید، لانیوس و مکینن<sup>۱۳</sup> (۲۰۱۸)، این اثربخشی مثبت همراه با نرخ ریزش پایین بوده است. طبق پژوهش اسکاتن، ون هورن، نیپشیر، کلبر و هاچمیکرز<sup>۱۴</sup>، (۲۰۱۹) هندرمانی نسبت به سایر درمان‌ها دارای نرخ ریزش پایینتری در افراد تروما زده است. همینطور، موریسون<sup>۱۵</sup> (۲۰۲۰) و ونلو- ریوارد<sup>۱۶</sup> (۲۰۲۰) نشان دادند که فعالیت‌های متفاوت هندرمانی می‌توانند در بهبود آزاردیدگان جنسی بسیار مفید باشند. مبانی نظری و پژوهشی ارائه شده نشان دادند که با توجه به اینکه صحبت در مورد ترومای جنسی می‌تواند احساس شرم و ترس را برانگیخته کند، حضور در درمان‌های کلامی ممکن است برای برخی دشوار و استرس‌زا باشد و آن‌ها از شروع یا ادامه‌ی درمان بازداشت شوند. با توجه به ماهیت غیرکلامی، امنیت‌بخش و غیرمستقیم هنر درمانی و ذهن‌آگاهی به نظر می‌رسد که این مداخلات می‌توانند برخی نیازهای درمانی خاص را در آزار دیدگان جنسی پوشش دهند. با وجود حمایت آثار پژوهشی از اثربخشی این دو روش بر بهبود علائم ناشی از انواع تروما، اثربخشی ترکیب ذهن‌آگاهی و هنر در زنان بزرگسال آزاردیده‌ی جنسی، قبلاً بررسی نشده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر ترکیب هنر و ذهن‌آگاهی بر نرخ ریزش و بهبود علائم استرس پس از سانحه در زنان با تجربه آزار جنسی بود.

## روش

ترکیب کنند (وارتیو-رجالین، سانتامکی- فیشر، جاکیسالو و فاگرستورم<sup>۱</sup>، ۲۰۲۰) و پردازش تجربه تروما را با یکپارچه کردن خاطرات آن، تسهیل کنند (واکر، کایمال، کافمن و دیگرaba<sup>۲</sup>، ۲۰۱۶) و در علائم استرس پس از سانحه بهبود ایجاد کنند. هنر با آن دسته از باورهای فرهنگی که مخالف ابراز هیجانی هستند، مقابله می‌کند (مون، ۲۰۱۶). از طرفی، اجتناب<sup>۳</sup> که مانع برای پردازش هیجانی تجارب مربوط به سانحه است (فوا و مکلین<sup>۴</sup>، ۲۰۱۶)، می‌تواند با ذهن‌آگاهی<sup>۵</sup> که پذیرش<sup>۶</sup> را کلینکبرگ و ون در دار<sup>۷</sup> (۲۰۱۵). روش‌های متصرک بر زمان حال (مانند ذهن‌آگاهی) شاید بتوانند تروما دیدگان را که از تهدیدهای گذشته در فرارند، به حال برگردانند (دایته ریچ- هارتول<sup>۸</sup>، ۲۰۱۷). بازماندگان آزار جنسی مورد حمله‌ی هیجانی و بدنی قرار گرفته‌اند و بدن آن‌ها می‌تواند ماشه چکانی برای یادآوری تروما باشد. به علاوه، تروما ارتباط روان و بدن را مختل می‌کند (ریسلی و ویلیامز<sup>۹</sup>، ۲۰۲۰)؛ بنابراین برقراری ارتباطی سالم با جسم خویش بخشی کلیدی از درمان است. هنر و ذهن‌آگاهی با بکارگیری بدن و تحريك حس‌های بدنی احساس آرامش را القا می‌کنند (هاینز<sup>۱۰</sup>، ۲۰۱۹).

پژوهش‌های متعددی از جمله سزوک و هازلت - استیونز<sup>۱۱</sup> (۲۰۱۹) و جانسون<sup>۱۲</sup> (۲۰۲۰) از اثربخشی مطلوب ذهن‌آگاهی بر علائم استرس پس از سانحه، از

<sup>1</sup>- Vaartio-Rajalin, Santamäki-Fischer, Jokisalo & Fagerström

<sup>2</sup>- Walker, Kaimal, Koffman & DeGrab

<sup>3</sup>- Avoidance

<sup>4</sup>- Foa & McLean

<sup>5</sup>- Mindfulness

<sup>6</sup>- Acceptance

<sup>7</sup>- Schoorl, Mil-Klinkenberg & Van Der Does

<sup>8</sup>- Dieterich-Hartwell

<sup>9</sup>- Riccelli & Williams

<sup>10</sup>- Hinz

<sup>11</sup>- Szoke & Hazlett-Stevens

<sup>12</sup>- Johnson

<sup>13</sup>- Boyd, Lanius & McKinnon

<sup>14</sup>- Schouten, van Hooren, Knipscheer, Kleber & Hutschemaekers

<sup>15</sup>- Morrison

<sup>16</sup>- Vanloo-Rivard

جهت جذب اعضاء، تعدادی اطلاعیه به صورت آنلاین و کاغذی در مورد برنامه درمانی و هدف آن در تعدادی از مراکز روان‌درمانی شهر همدان قرار گرفت تا افرادی که مایل به مشارکت یا کسب اطلاعات بیشتر بودند به صورت تلفنی یا با ایمیل با مصاحبه‌کننده ارتباط برقرار کنند. پیش از شروع جلسات درمانی مرحله‌ی پیش‌آزمون با تکمیل پرسشنامه‌های تأثیر رویداد و افسردگی-اضطراب- استرس- ۲۱ (مؤلفه‌ی استرس) اجرا شد. منشور اجرا شده که در جدول ۱ ارائه شده است، برگرفته از برنامه‌ی هنردرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی موتی و همکاران<sup>۱</sup> (۲۰۱۲) برای بیماران سلطانی بود. این منشور منصور درمانی برای انجام پژوهش حاضر، با مشورت یک متخصص ذهن‌آگاهی و یک هنر درمانگر متناسب با نیازهای درمانی آزاردیدگان جنسی تغییر یافت.

اعضای گروه آزمایش به مدت دو ماه، هفت‌های یک‌بار در هشت جلسه ۲ ساعته ترکیبی هنردرمانی (یک ساعت) و ذهن‌آگاهی (یک ساعت) در یک کلینیک روان‌درمانی در همدان حضور پیدا کردند؛ اما گروه کنترل تا پیش از پایان پژوهش، در هیچ جلسه‌ای حضور نیافت. شرکت کنندگان می‌توانستند در صورت تمایل، بازخوردهای خود را از جلسات در دفترچه‌ای ثبت کنند. پس از پایان جلسات، مراحل پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با تکمیل پرسشنامه‌های تأثیر رویداد و افسردگی-اضطراب- استرس- ۲۱ (مؤلفه‌ی استرس) انجام شد. جهت حفظ اصل رازداری، به جای نام شرکت کنندگان، از کد استفاده شد. به علاوه مرکز روان‌درمانی انحصاراً توسط این گروه استفاده و افراد دیگری همزمان حضور نداشتند. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه بود. جامعه‌ی آماری شامل زن‌های با سابقه آزار جنسی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌درمانی شهر همدان در سال ۱۳۹۸ بود. در این مطالعه ۱۸ زن تا ۴۹ ساله با سابقه آزار جنسی به روش نمونه‌گیری هدفمند و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. از این تعداد یک نفر به دلیل سوگ خانوادگی و یک نفر به دلیل نامشخص، پیش از شروع جلسات به همکاری خود به مطالعه پایان دادند. نمونه‌ی نهایی دارای ۱۶ عضو بود. ملاک‌های ورود شامل موارد زیر بود: جنسیت زن، تجربه‌ی آزار جنسی و داشتن علائم استرس پس از سانحه با شدت متوسط (نمرات ۳۲-۲۴ در پرسشنامه‌ی تأثیر رویداد)، نداشتن علائم اسکیزوفرنی یا اختلالات هذیانی و دوقطبی نوع یک، عدم مصرف مواد، استرس پس از سانحه تمام‌عيار به دلیل آزار جنسی یا دلایل دیگر، یا ابتلا به اختلالات شخصیت به طور تمام‌عيار، نداشتن افکار فعال خودکشی (همگی با مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای اختلال‌های محور I و II بررسی شدند)، داشتن اجازه از روانپزشک برای استفاده از میزان مشخصی از دارو در طول روان‌درمانی (در صورت مصرف داروهای روانپزشکی)، مشارکت نکردن در جلسات روان‌درمانی طی شش ماه اخیر، حداقل ۱۸ سال داشتن و داشتن رضایت آگاهانه. ملاک‌های خروج نیز شامل موارد زیر بود: عدم تمایل شرکت کنندگان به ادامه درمان و بدتر شدن علائم استرس پس از سانحه (که به کمک گزارش خود مراجعه کنندگان، پرسشنامه تأثیر رویداد و مولفه استرس پرسشنامه افسردگی اضطراب استرس- ۲۱ ارزیابی می‌شد).

<sup>۱</sup>- Monti, Kash, Kunkel, Brainard, Wintering & et al

## ۲۲ و شاخص‌های توصیفی و تحلیل کوواریانس یک-

## جدول ۱ خلاصه جلسات ترکیبی هندرمانی و ذهن‌آگاهی

جلسه	محتوای جلسه	فعالیت ذهن‌آگاهی	فعالیت هنر درمانی
یکم		آموزش آگاهی از لحظه حال و سایر مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی،	آموزش خود آرام- بخشی با تنفس دیافراگمی، انجام وارسی
		(اسکن) بدنی، تهیه تصویری از «مکان امن»	
دوم		صحبت درباره تکلیف خانگی، آموزش ذهن‌آگاهی، آموزش	انجام تمرين گرم کردن، تهیه کلاژی از بدن با توجه به تجربه وارسی
		توجه با کمک تنفس، تجربه جداگانه محرک‌های مربوط به هر	ناشی از تجربه هر یک از حواس پنج گانه به صورت جداگانه
سوم		صحبت درباره تکلیف خانگی، آموزش در خصوص رابطه ذهن و	از کشش آرام
		بدن، انجام کشش آرام	انجام تمرين گرم کردن، تهیه مجسمه‌ای با گل رس از حس خود
چهارم		صحبت درباره تکلیف خانگی، آموزش در خصوص حل مسئله	پیش از کشش آرام)، تهیه مجسمه‌ای با گل رس از حس خود (پس
		خلاقانه، پذیرش و توجه پذیرا، انجام مراقبه دریاچه، اسکن	از کشش آرام)
پنجم		صحبت درباره تکلیف خانگی، آموزش گسترش آگاهی و انجام	تمرين گرم کردن، تهیه کلاهی مقوای که درون آن افکار و احساسات
		مراقبه صدای- تنفس- حس‌های بدنی- افکار و هیجان‌ها، آموزش	درونی بیمار در خصوص تروما ثبت شده‌اند و روی آن نمود بیرونی
ششم		کنار آمدن با افکار و احساسات (مربوط به تروما)	کشیدن تصویری از بدن و رنگی کردن
		اصطبابی که هنگام تجربه استرس ناشی از تروما در فرد فعل می‌شود،	اعضایی که هنگام تجربه استرس ناشی از تروما در فرد فعل می‌شود،
هفتم		تصویری از یک خاطره دلپذیر رسم و درباره اثر نگاه کردن به آن بر	تصویری از یک خاطره دلپذیر رسم و درباره اثر نگاه کردن به آن بر
		عملکرد اعصابی بدن صحبت می‌شود.	اعضایی که هنگام تجربه استرس ناشی از تروما در فرد فعل می‌شود،
هشتم		اصتبک و روابط استرس زا	کشیدن تصویری از خود، قبل و بعد از تروما و نوشتن مکالمه‌ای بین این
		دو	دو
		صحبت درباره تکلیف خانگی، آموزش مراقبه مهربانی و	تمرين گرم کردن، تهیه ماسکی از چهره‌ی تروما با گل رس،
		عشق‌ورزی، انجام مراقبه عشق‌ورزی	ترسم تصویری از خود، قبل و بعد از تروما و نوشتن مکالمه‌ای بین این
نهم		صحبت درباره تکلیف خانگی، انجام تجسم هدایت شده تنفس در	شعار علیه آزار جنسی، صحبت درباره برنامه‌ی درمانی، کشیدن
		حاله‌ی نور، انجام مراقبه‌ی مهربانی و عشق‌ورزی و بستن جلسه	تصویری از خود در سلامت و آرامش کامل

مؤلفه افکار مزاحم، اجتناب و بیش برانگیختگی است. گوییه‌های این پرسشنامه از صفر تا ۴ نمره گذاری می‌شوند و نمره کلی در بازه صفر تا ۸۸ خواهد بود (ویس، ۲۰۰۷). پایایی این پرسشنامه توسط دیوی، هرد و لیننگر<sup>۳</sup> (۲۰۱۵)

ا بزار پرسشنامه تأثیر رویداد<sup>۱</sup>: این پرسشنامه توسط ویس<sup>۲</sup> در سال ۲۰۰۷ طراحی شد و رنج درونی ناشی از تروما را می‌سنجد. پرسشنامه تأثیر رویداد دارای ۲۲ سؤال و سه

<sup>۳</sup>- Davey, Heard & Lennings

۱- The Impact of Event Scale -Revised

۲- Weiss

آکوستا و تارتار<sup>۶</sup>، ۲۰۱۵؛ فینک<sup>۷</sup>، ۲۰۱۶؛ مانگک و میلاد<sup>۸</sup>، میلاد<sup>۹</sup>، ۲۰۱۷.

### یافته‌ها

از بین ۱۸ نفر اعضای نمونه، یک نفر به دلیل تجربه سوگ خانوادگی و یک نفر به دلیل نامشخص، پیش از شروع جلسات، به همکاری خود با پژوهشگران پایان دادند. میانگین سنی گروه‌های آزمایش و کنترل به ترتیب ۳۲/۶۳ و ۲۹/۱۲ بود. بررسی سطح تحصیلی شرکت کنندگان نشان داد که ۱ نفر (۶/۲۵٪) دیپلم، ۵ نفر (۳۱/۲۵٪) کارشناسی و ۱۰ نفر (۶۲/۵٪) دارای مدرک کارشناسی ارشد؛ همچنین از نظر وضعیت تأهل، ۴ نفر (۲۵٪) مجرد و ۱۲ نفر (۷۵٪) متاهل؛ از نظر تعداد فرزند ۳ نفر (۱۸/۷۵٪) دارای ۱ فرزند، ۲ نفر (۱۲/۵٪) دارای ۲ فرزند و ۲ نفر (۱۲/۵٪) دارای ۳ فرزند بودند. از نظر وضعیت اشتغال نیز ۲ نفر (۱۲/۵٪) خانه‌دار، ۲ نفر (۱۲/۵٪) دانشجو و سایرین شاغل بودند. در جدول ۲ شاخص میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری ارائه شده است.

۰/۹۳۰ محاسبه شد و در ایران نیز شریف نیا و همکاران (۲۰۲۱) آلفای کرونباخ آن را در بازه ۰/۸۴ تا ۰/۹۳ گزارش کردند. به دلیل کوچک بودن حجم نمونه، امکان محاسبه پایایی این ابزار در پژوهش حاضر وجود نداشت. در این پژوهش، شرکت کنندگان سوالات را در رابطه با هفتۀ اخیر پاسخ دادند. همچنین، از نمره کلی این پرسشنامه برای تعیین شدت علائم استرس پس از سانجه استفاده شد. به علاوه، شدت متوسط علائم استرس پس از سانجه یکی از ملاک‌های ورود بود.

**پرسشنامه افسردگی- اضطراب- استرس-**<sup>۱۰</sup> این پرسشنامه در سال ۱۹۹۵ توسط لاویاند و لاویاند<sup>۱۱</sup> برای سنجش رنج روانی طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ آیتم و سه مؤلفه افسردگی، اضطراب و استرس را می‌سنجد. هر آیتم روی یک مقیاس لیکرت از صفر- ۳ نمره گذاری می‌شود. آلفای کرونباخ این ابزار در مطالعه کاکر، کاکر و سانی<sup>۱۲</sup> (۲۰۱۸) ۰/۹۱ بود. همچنین در ایران کاکه مم، نوابی، البیسی<sup>۱۳</sup>، سعیدی‌کیا، روحی و همکاران (۲۰۲۲) آلفای کرونباخ این ابزار را ۰/۹۳ نمودند. به دلیل کوچک بودن حجم نمونه، امکان محاسبه پایایی این ابزار در پژوهش حاضر وجود نداشت. در این پژوهش، از مؤلفه استرس مقیاس افسردگی- اضطراب- استرس- ۲۱ به عنوان شاخصی ثانویه از بهبود علائم استرس پس از سانجه استفاده شد. همبستگی استرس و علائم استرس پس از سانجه در مطالعات پیشین بررسی شده است (هولمگارد، یاناکاکیس، مارتینز، کارستافت و اندرسن<sup>۱۴</sup>، ۲۰۱۵؛ آلوماری، فرناندز، بنکس،

<sup>۶</sup>- Alomari, Fernandez, Banks, Acosta & Tartar

<sup>۷</sup>- Fink

<sup>۸</sup>- Maeng & Milad

<sup>۹</sup>- Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS)

<sup>۱۰</sup>- Lovibond & Lovibond

<sup>۱۱</sup>- Coker, Coker & Sanni

<sup>۱۲</sup>- Albelbeisi

<sup>۱۳</sup>- Holmgård, Yannakakis, Martínez, Karstoft & Andersen

جدول ۲ شاخص میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیر	مرحله	گروه آزمایش (N=8)					
		میانگین	انحراف استاندارد	میانگین	انحراف استاندارد	آزمون تی مستقل	آزمون سطح معناداری
افکار مزاحم	پیش آزمون	۱۱/۸۸	۱/۷۳	۹/۸۸	۲/۱۰	۲/۰۸۱	۰/۰۵۶
برانگیختگی	پس آزمون	۷/۵۰	۱/۹۳	۱۰/۶۳	۱/۵۱	-۳/۶۱۴	۰/۰۰۳
اجتناب	پیگیری	۵/۷۵	۱/۹۱	۹/۶۳	۱/۳۱	-۴/۷۴۳	۰/۰۰۱
استرس	پیش آزمون	۷/۸۸	۱/۴۶	۸/۲۵	۱/۴۹	-۰/۰۵۹	۰/۶۱۹
اجتناب	پس آزمون	۴/۱۳	۱/۸۵	۸/۳۸	۲/۰۷	-۴/۲۹۸	۰/۰۰۱
برانگیختگی	پیگیری	۳/۱۳	۱/۲۵	۷/۱۳	۱/۴۶	-۵/۸۹۹	۰/۰۰۱
اجتناب	پیش آزمون	۹/۶۳	۱/۸۵	۱۱/۷۵	۲/۱۲	-۲/۳۶۴	۰/۰۳۳
اجتناب	پیگیری	۶/۳۸	۱/۴۱	۱۱/۸۸	۲/۶۴	-۴/۹۹۸	۰/۰۰۱
برانگیختگی	پیش آزمون	۱۹/۲۵	۲/۶۰	۲۰/۲۵	۳/۱۰	-۰/۶۹۸	۰/۴۹۷
استرس	پس آزمون	۹/۷۵	۳/۱۰	۱۸/۵۰	۲/۵۶	-۶/۱۴۶	۰/۰۰۱
اجتناب	پیگیری	۱۰	۲/۶۲	۱۸/۲۵	۳/۶۱	-۵/۲۲۷	۰/۰۰۱

استرس مؤثر بوده است. از سوی دیگر مشخص شد که بین نمرات پیش آزمون گروه های کنترل و آزمایش در متغیر اجتناب، تفاوت جزئی وجود دارد. برای کنترل چنین تفاوت هایی از روش تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد که نتایج آن در جدول ۳ قابل مشاهده است.

طبق جدول فوق، در مورد هر چهار متغیر افکار مزاحم، برانگیختگی، اجتناب و استرس نمرات گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری به شکل معناداری از پیش آزمون کمتر هستند ( $P<0.001$ ). در نتیجه برنامه درمانی هنر و ذهن آگاهی بر کاهش علائم استرس پس از سانحه و

جدول ۳ نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه با اندازه گیری مکرر مربوط به اثرات درون گروهی و برون گروهی

مرحله	منبع تغییر	مجموع متغیر وابسته					
		متغیر	درجه آزادی	مجذورات آزادی	مجذورات معدنادری	میانگین اثر	سطح اندازه
افکار مزاحم	پیش آزمون	۱۰/۳۳	۱	۱۰/۳۳	۴/۲۶	۰/۰۶۰	۰/۲۵
برانگیختگی	اجتناب	۱۵/۰۴	۱	۱۵/۰۴	۴/۹۲	۰/۰۴۵	۰/۲۷
استرس	اجتناب	۸/۹۴	۱	۸/۹۴	۲/۳۳	۰/۱۵۱	۰/۱۵
افکار مزاحم	گروه	۱/۵۸	۱	۱/۵۸	۰/۱۸	۰/۶۷۵	۰/۰۱
برانگیختگی	اجتناب	۴۹/۳۴	۱	۴۹/۳۴	۲۰/۳۴	۰/۰۰۱	۰/۶۱
اجتناب	استرس	۶۲/۴۰	۱	۶۲/۴۰	۲۰/۴۳	۰/۰۰۱	۰/۶۱
افکار مزاحم	پس آزمون	۵۵/۰۲	۱	۵۵/۰۲	۱۴/۳۲	۰/۰۰۲	۰/۵۲
اجتناب	خطا	۲۸۸/۰۷	۱	۲۸۸/۰۷	۳۳/۴۶	۰/۰۰۱	۰/۷۲
افکار مزاحم	استرس	۳۱/۵۴	۱۳	۳۱/۵۴	۲/۴۳		
برانگیختگی	اجتناب	۳۹/۷۱	۱۳	۳۹/۷۱	۳/۰۵		
اجتناب	استرس	۴۹/۹۳	۱۳	۴۹/۹۳	۳/۸۴		
استرس		۱۱۱/۹۱	۱۳	۱۱۱/۹۱	۸/۶۱		

پیگیری							
خطا							
۰/۰۱	۰/۷۸۶	۰/۰۸	۰/۲۲	۱	۰/۲۲	افکار مزاحم	پیش‌آزمون
۰/۰۳	۰/۵۳۴	۰/۴۱	۰/۷۸	۱	۰/۷۸	برانگیختگی	
۰/۱۶	۰/۱۳۴	۲/۵۵	۱۰/۲۹	۱	۱۰/۲۹	اجتناب	
۰/۰۳	۰/۵۶۴	۰/۳۵	۳/۶۵	۱	۳/۶۵	استرس	
۰/۵۷	۰۰۱	۱۷/۱۵	۴۹/۰۲	۱	۴۹/۰۲	افکار مزاحم	
۰/۷۱	۰/۰۰۱	۳۱/۷۴	۶۰/۹۶	۱	۶۰/۹۶	برانگیختگی	گروه
۰/۵۵	۰/۰۰۲	۱۵/۷۱	۶۳/۳۷	۱	۶۳/۳۷	اجتناب	
۰/۶۷	۰/۰۰۱	۲۶/۲۸	۲۷۴/۵۹	۱	۲۷۴/۵۹	استرس	
		۲/۸۶	۱۳		۳۷/۱۵	افکار مزاحم	
		۱/۹۲	۱۳		۲۴/۹۷	برانگیختگی	
		۴/۰۳	۱۳		۵۲/۴۶	اجتناب	
		۱۰/۴۵	۱۳		۱۳۵/۸۵	استرس	

(۲۰۱۹) هنر می‌تواند به خاطرات پراکنده ناہشیار و اطلاعات ذخیره شده در بدن دستیابد. از سویی دیگر، کاظمی، شجاعی و سلطانی زاده (۱۳۹۶) از اهمیت پذیرش در بهبود افکار مزاحم حمایت کردند. همچنین رفی، پینکیوتی، دارنل و اورکات<sup>۴</sup> (۲۰۱۹) از عنصر غیر قضاوتی بودن به عنوان عامل مهمی در بهبود افکار مزاحم یاد کردند. به اعتقاد ون در کالک<sup>۵</sup> (۲۰۲۲) نیز افکار مزاحم تماس فرد را با زمان حال دشوار می‌سازند.

از یافته‌ها می‌توان اینگونه تبیین کرد که خاطرات مربوط به ترومای جنسی به دلیل ذخیره شدن به شکل تکه‌تکه و تصویری و به دلیل برانگیختن احساس شرم به سختی کلامی سازی می‌شوند. به علاوه، هولناکی یک تجربه تروماییک می‌تواند «هضم» و پردازش آن را دشوار کند. هنر فضایی برای ترکیب و بازسازی هر آنچه از ترومما در حافظه موجود است را فراهم می‌کند. عدم بیان این افکار مزاحم، می‌تواند احتمال بازگشت آنها را بیشتر کند. هنر با تولید یک محصول معنادار فضایی برای ابراز فراهم کرده و از بازگشت خاطرات پراکنده‌ای که فرد قادر به

نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در جدول ۳ نشان داد که گروه‌های کنترل و آزمایش در مراحل پس‌آزمون و پیگیری به میزان معناداری در نمرات افکار مزاحم ( $P<0/001$ )، برانگیختگی ( $P<0/002$ )، اجتناب ( $P<0/001$ ) و استرس ( $P<0/002$ ) متفاوت هستند. در نتیجه یافته‌ها نشان می‌دهد که ترکیب هنر و ذهن‌آگاهی به شکل معناداری علائم افکار مزاحم، برانگیختگی، اجتناب و استرس را در گروه آزمایش کاهش داد؛ اما چنین تغییری در گروه کنترل مشاهده نشد.

## بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی برنامه درمانی هنر و ذهن‌آگاهی بر علائم استرس پس از سانحه در گروهی از زنان آزار دیده‌ی جنسی بود. اولین یافته این مطالعه تأثیر معنادار این روش درمانی بر کاهش افکار مزاحم بود، که همسو با پژوهش‌های دکر، دیور، ابی، کمپبل و ترپین<sup>۱</sup> (۲۰۱۸) و پنس، کتز، هافمن و کاجوکار<sup>۲</sup> (۲۰۱۴) در جمعیت‌های مشابه بود. طبق پژوهش بین<sup>۳</sup>

<sup>۴</sup>- Reffi, Pinciotti, Darnell & Orcutt

<sup>۵</sup>- Van der Kolk

<sup>۱</sup>- Decker, Deaver, Abbey, Campbell & Turpin

<sup>۲</sup>- Pence, Katz, Huffman & Cojucar

<sup>۳</sup>- Bian

قدرتی برای تهدید ندارد. این آگاهی حس امنیت مراجعه کنندگان را تأمین و برانگیختگی را کاهش می‌دهد. همچنین، تحریک عمدی حس‌های بدنی در هنردرمانی و ذهن‌آگاهی و در غیاب عوامل تهدید زا، می‌تواند نشان دهد که فعالیت سیستم سمباتیک (که یادآور برانگیختگی هنگام وقوع تروما است) الزاماً به معنای در خطر بودن در حال حاضر نیست. به علاوه، ذهن‌آگاهی با تمرکز بر تنفس می‌تواند توجه افرادی به عوامل خطر هنگام برانگیختگی را کاهش دهد. همچنین، علاوه بر تأکید ذهن‌آگاهی بر زمان حال، افراد در هنگام انجام فعالیت‌های هنری در واقع کاملاً در زمان حال درگیر می‌شوند.

سومین یافته این مطالعه تأثیر معنadar هنردرمانی و ذهن‌آگاهی بر کاهش اجتناب بود. این یافته همسو با پژوهش‌های جاورسکی<sup>۸</sup> (۲۰۲۰) و کالمانوویتز و هو<sup>۹</sup> (۲۰۱۶) بود. در این راستا، ون در کالک (۲۰۲۲) بیان می‌کند که در ابتدای درمان تروما، باید مراجع را در فاصله‌ای از خاطرات تروما نگاه داشت تا شروع به رفتارهای اجتنابی نکند. همچنین کالمانوویتز و هو (۲۰۱۶) معتقد هستند که ذهن‌آگاهی با تقویت شفقت به خود، اجتناب را کاهش می‌دهد. طبق پژوهش ناراگون-گینی، مکماهون و چاکو<sup>۱۰</sup> (۲۰۱۷) نیز ذهن‌آگاهی با افزایش توانایی تحمل رنج، اجتناب را کاهش می‌دهد.

در تبیین چگونگی کاهش اجتناب می‌توان گفت که هنر به افراد اجازه می‌دهد تا مطابق میزان آمادگی شخصی خود به خاطرات تروما نزدیک شوند. به بیان برخی پژوهشگران درمان‌های غیرکلامی مبتنی بر هنر از مکانیسم‌های سانسور کننده شناختی گذر کرده و بیان

بیانشان نیست جلوگیری می‌کند. آموزش ذهن‌آگاهی با تأکید بر پذیرش، مقاومت افراد در برابر افکار مزاحم را کمتر کرده و روشی متفاوت برای روپردازی خاطرات رنج آور به آن‌ها می‌آموزد. ذهن‌آگاهی با تأکید بر توصیف کردن بهجای برچسب خوب و بد زدن (د بروین، فورمسما، فریجشتاین و بوگلز<sup>۱</sup>، ۲۰۱۷) با «مزاحم» دانستن خاطرات تروما مقابله و به افراد توصیه می‌کند که بیشتر مشاهده‌گر و کمتر قضاوت‌گر تجارت روانی خود باشند.

دومین یافته این مطالعه تأثیر معنadar هنردرمانی و ذهن‌آگاهی بر کاهش برانگیختگی بود، که همسو با پژوهش‌های کاست<sup>۲</sup> (۲۰۱۹) و دکر و همکاران (۲۰۱۹) بود. کایمال، ری و مونیز<sup>۳</sup> (۲۰۱۶) در پژوهش خود به آرامبخشی فعالیت‌های هنری اشاره نمودند. همچنین دکر و همکاران (۲۰۱۸) توانایی هنر در ایجاد حس امنیت و کاهش حس تهدید را عوامل مهمی در کاهش برانگیختگی دانستند. طبق مطالعه دوراس و کرولی<sup>۴</sup> (۲۰۱۴) تمرینات یوگا با کاهش ضربان قلب برانگیختگی را تسکین می‌دهند. کینگ<sup>۵</sup> (۲۰۱۶) و فائزو<sup>۶</sup> (۲۰۱۸) نیز در مطالعات خود، هنر و ذهن‌آگاهی را در تجربه لحظه حال کمک کننده دانستند. همچنین در پژوهش لبوتیلیر، فترنر و ازمندsson<sup>۷</sup> (۲۰۱۶)، بهبود علائم برانگیختگی به تحریک عمدی حس‌های بدنی نسبت داده شده است.

در تبیین بهبود برانگیختگی، می‌توان گفت که «منجمد کردن» تجربه تروما در یک اثر هنری این حس را القا می‌کند که این حادثه، ایستا و غیرزنده است و دیگر

<sup>1</sup>- De Bruin, Formsma, Frijstein & Bögels

<sup>2</sup>- Kost

<sup>3</sup>- Kaimal, Ray & Muniz

<sup>4</sup>- Duros & Crowley

<sup>5</sup>- King

<sup>6</sup>- Fonzo

<sup>7</sup>- LeBouthillier, Fetzner & Asmundson

<sup>8</sup>- Jaworski

<sup>9</sup>- Kalmanowitz & Ho

<sup>10</sup>- Naragon-Gainey, McMahon & Chacko

### نتیجه‌گیری

براساس یافته‌های این پژوهش، درمان ترکیبی هنر و ذهن آگاهی می‌تواند روش مؤثری برای برخی از آزاردیدگان جنسی باشد. درمانگران می‌توانند برای ترغیب مراجعه کنندگانی که به دلیل ترس یا شرم مایل به صحبت از تروماتی خود نیستند از این روش درمانی استفاده کنند. از مهم‌ترین محدودیت‌های این مطالعه، حجم نمونه کوچک آن، دوره پیگیری کوتاه، امکان ناپذیر بودن نمونه‌گیری تصادفی (به دلیل گزارش نشدن یا محرومانه بودن اطلاعات) بودند. جهت انجام پژوهش‌های آتنی مطالعه در مورد گروه‌های اقلیت (مثلاً آزار جنسی در سایر جنسیت‌ها) پیشنهاد می‌شود؛ چرا که آنچه امروز می‌دانیم، براساس مطالعه اکثریت‌های قومی و فرهنگی است. سایر متغیرها مانند آزارگر جنسی و ارتباط او با آزاردیده و نقش نوع درمان بر نرخ ریزش می‌توانند بررسی شوند.

### سپاسگزاری

نویسنده‌گان این پژوهش، صمیمانه از شرکت کنندگان محترم و دکتر سید مجتبی احمدی (استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) بابت حمایت‌هایشان کمال تشکر را دارند. بخشی از هزینه‌های این پژوهش به وسیله‌ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخت شده است. قابل ذکر است که نویسنده‌گان این مقاله هیچ تعارض منافعی ندارند. این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی به شماره کارآزمایی بالینی IRCT20120619010063N8 و کد اخلاق IR.KUMS.REC.1398.293 از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌باشد.

مواد روانشناسی مورد اجتناب را تسهیل می‌کنند (لبان<sup>۱</sup>، ۲۰۱۷). همچنین، ذهن آگاهی با تأکید بر گشودگی نسبت به تجربیات روانی، اعم از خوشایند یا دردناک، اثری مخالف با اجتناب دارد. احساس شرم و گناه پس از تجربه آزار جنسی، به دلیل ناخوشایند بودن، موجب می‌شوند که فرد آزار دیده نه تنها از خاطرات تروما، بلکه از خود و احساسات خود نیز گریزان باشد. ذهن آگاهی با افزایش شفقت به خود، این عوامل روانی تقویت کننده اجتناب را تسکین داده و به این ترتیب اجتناب کمتر می‌شود. به علاوه، آموزش‌های ذهن آگاهی مانند تن آرامی یا تمرکز بر تنفس، می‌توانند افراد را به توانایی‌هایی مجهر کنند تا آن‌ها با اطمینان خاطر و احساس کنترل بیشتر با خاطرات آزاردهنده تروما مواجه شوند و از آن‌ها اجتناب نکنند.

نکته دیگر در پژوهش حاضر، عدم وقوع ریزش پس از شروع جلسات درمان بود. این نکته در مورد گروه آزمایش که خود را در معرض ارتباط با خاطرات تروما قرار دادند، اهمیت دارد. در پژوهش هرناندز-تجاد، همسکی و سانچز-کرسودو<sup>۲</sup> (۲۰۱۹) اهمیت داشتن حمایت اجتماعی در فضای درمانی برای ادامه درمان مطرح شده است. احتمال دارد که هم گروهی‌ها نقش خانواده غیر حمایتگر آزاردیدگان را به شکلی اصلاح شده ایفا کرده باشند. به علاوه، به نقل از لوئیس و همکاران (۲۰۲۰) مداخلاتی که تمرکز مستقیم بر تروما را حذف می‌کنند، قابل تحمل تر بوده و به ادامه مشارکت در درمان کمک می‌کنند. مطالعات بیشتری در این زمینه موردنیاز است.

<sup>1</sup>- Lobban

<sup>2</sup>- Hernandez-Tejada, Hamski & Sánchez-Carracedo

## References

- Alomari RA, Fernandez M, Banks JB, Acosta J, Tartar JL. (2015). Acute stress dysregulates the LPP ERP response to emotional pictures and impairs sustained attention: time-sensitive effects. *Brain sciences*, 5(2), 201-219.
- Aloosh M, Salavati A, Aloosh A. (2019). Economic sanctions threaten population health: the case of Iran. *Public health*, 169, 10-13.
- Behbehani AA. (2015). A portrait of a nation: Culturally sensitive art therapy in the Arab world. *The Wiley Handbook of Art Therapy*, 735-744.
- Bian W. (2019). Art therapy and its effectiveness with children who have experienced trauma. University of Wisconsin-Superior.
- Boyd JE, Lanius RA, McKinnon MC. (2018). Mindfulness-based treatments for posttraumatic stress disorder: a review of the treatment literature and neurobiological evidence. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 43(1), 7-25.
- Chong CYJ. (2015). Why art psychotherapy? Through the lens of interpersonal neurobiology: The distinctive role of art psychotherapy intervention for clients with early relational trauma. *International Journal of Art Therapy*, 20(3), 118-126.
- Cloitre M. (2015). The “one size fits all” approach to trauma treatment: Should we be satisfied? *European Journal of Psychotraumatology*, 6(1), 27344.
- Coker A, Coker O, Sanni D. (2018). Psychometric properties of the 21-item depression anxiety stress scale (DASS-21). *African Research Review*, 12(2), 135-142.
- Cowburn M, Gill AK, Harrison K. (2015). Speaking about sexual abuse in British South Asian communities: offenders, victims and the challenges of shame and reintegration. *Journal of Sexual Aggression*, 21(1), 4-15.
- Davey C, Heard R, Lemmings C. (2015). Development of the Arabic versions of the impact of events Scale-Revised and the posttraumatic growth inventory to assess trauma and growth in middle Eastern refugees in Australia. *Clinical Psychologist*, 19(3), 131-139.
- De Bruin EI, Formsma AR, Frijstein G, Bögels SM. (2017). Mindful2Work: effects of combined physical exercise, yoga, and mindfulness meditations for stress relieve in employees. A proof of concept study. *Mindfulness*, 8(1), 204-217.
- Decker KP, Deaver SP, Abbey V, Campbell M, Turpin C. (2018). Quantitatively improved treatment outcomes for combat-associated PTSD with adjunctive art therapy: randomized controlled trial. *Art Therapy*, 35(4), 184-194.
- Dieterich-Hartwell R. (2017). Dance/movement therapy in the treatment of post traumatic stress: A reference model. *The arts in psychotherapy*, 54, 38-46.
- Duros P, Crowley D. (2014). The body comes to therapy too. *Clinical Social Work Journal*, 42(3), 237-246.
- Dworkin ER, Krahé B, Zinzow H. (2021). The global prevalence of sexual assault: A systematic review of international research since 2010. *Psychology of violence*, 11(5), 497.
- Fink G. (2016). Stress, definitions, mechanisms, and effects outlined: Lessons from anxiety Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior (pp. 3-11): Elsevier.
- Foa EB, McLean CP. (2016). The efficacy of exposure therapy for anxiety-related disorders and its underlying mechanisms: The case of OCD and PTSD. *Annual review of clinical psychology*, 12, 1-28.
- Fonzo GA. (2018). Diminished positive affect and traumatic stress: A biobehavioral review and commentary on trauma affective neuroscience. *Neurobiology of Stress*, 9, 214-230.
- Hernandez-Tejada MA, Hamski S, Sánchez-Carracedo D. (2017). Incorporating peer support during in vivo exposure to reverse dropout from prolonged exposure therapy for posttraumatic stress disorder: Clinical outcomes. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 52(4-6), 366-380.

- Hinz LD. (2019). Expressive therapies continuum: A framework for using art in therapy: Routledge.
- Holmgard C, Yannakakis GN, Martínez HP, Karstoft KI, Andersen HS. (2015). Multimodal ptsd characterization via the startlemart game. *Journal on Multimodal User Interfaces*, 9(1), 3-15.
- Jaffe AE, Cero I, DiLillo D. (2021). The# MeToo movement and perceptions of sexual assault: College students' recognition of sexual assault experiences over time. *Psychology of violence*, 11(2), 209.
- Jang SH, Kang SY, Lee HJ, Lee SY. (2016). Beneficial effect of mindfulness-based art therapy in patients with breast cancer- a randomized controlled trial. *Explore*, 12(5), 333-340.
- Jaworski E. (2020). Creating a Space to Externalize: Mindfulness Based Art Therapy for Childhood Trauma, A Literature Review.
- Johnson EC. (2020). Mindfulness and Technology: Evaluating an Online Mindfulness Intervention for Symptoms Related to Sexual Assault: Western Michigan University.
- Kaimal G, Ray K, Muniz J. (2016). Reduction of cortisol levels and participants' responses following art making. *Art Therapy*, 33(2), 74-80.
- Kakemam E, Navvabi E, Albelbeisi AH, Saeedikia F, Rouhi A, Majidi S. (2022). Psychometric properties of the Persian version of Depression Anxiety Stress Scale-21 Items (DASS-21) in a sample of health professionals: a cross-sectional study. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1-9.
- Kalmanowitz D, Ho RT. (2016). Out of our mind. Art therapy and mindfulness with refugees, political violence and trauma. *The arts in psychotherapy*, 49, 57-65.
- Kaur M, Murphy D, Smith KV. (2016). An adapted imaginal exposure approach to traditional methods used within trauma-focused cognitive behavioural therapy, trialled with a veteran population. *The Cognitive Behaviour Therapist*, 9.
- Kazemi H, Shojaei F, Soltanizadeh M. (2018). The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction Intervention on Psychological Flexibility, Distress Tolerance, and Re-Experiencing the Trauma in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder. *Military Caring Sciences*, 4(4), 236-248. doi:10.29252/mcs.4.4.236. (In Persian)
- Kazlauskas E. (2017). Challenges for providing health care in traumatized populations: barriers for PTSD treatments and the need for new developments. *Global health action*, 10(1), 1322399.
- Kessler RC, Rose S, Koenen KC, Karam EG, Stang PE, Stein DJ, Heeringa SG, Hill ED, Liberzon I, McLaughlin KA, McLean SA. (2014). How well can post-traumatic stress disorder be predicted from pre-trauma risk factors? An exploratory study in the WHO World Mental Health Surveys. *World Psychiatry*, 13(3), 265-274.
- King JL. (2016). Art therapy, trauma, and mindfulness: Theoretical and practical perspectives.
- Kost K. (2019). Fostering Creativity for Healing: A Literature Review on the Use of Art Therapy and Mindfulness with Traumatized Adults.
- LeBouthillier DM, Fetzner MG, Asmundson GJ. (2016). Lower cardiorespiratory fitness is associated with greater reduction in PTSD symptoms and anxiety sensitivity following aerobic exercise. *Mental Health and Physical Activity*, 10, 33-39.
- Lewis C, Roberts NP, Gibson S, Bisson JI. (2020). Dropout from psychological therapies for post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults: systematic review and meta-analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), 1709709.
- Lobban J. (2017). Art therapy with military veterans: Trauma and the image: Routledge.
- Lovibond PF, Lovibond SH. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. *Behaviour research and therapy*, 33(3), 335-343. doi:10.1016/0005-7967(94)00075-u.

- Maeng LY, Milad MR. (2017). Post-traumatic stress disorder: The relationship between the fear response and chronic stress. *Chronic Stress*, 1, 2470547017713297.
- Maktoubian M, Ghasemi V, Hashemianfar A. (2015). Data-based model expression for sociological studying of sexual assault and lack of safety in women in hospitals. *Journal of Social Problems of Iran*, 6(1), 151-192. (In Persian)
- Monti DA, Kash KM, Kunkel EJ, Brainard G, Wintering N, Moss AS, Rao H, Zhu S, Newberg AB. (2012). Changes in cerebral blood flow and anxiety associated with an 8-week mindfulness programme in women with breast cancer. *Stress and Health*, 28(5), 397-407.
- Morrison J. (2020). Claywork in Art Therapy With Survivors of Childhood Sexual Abuse. Lesley, Expressive Therapies Capstone Theses.
- Naragon-Gainey K, McMahon TP, Chacko TP. (2017). The structure of common emotion regulation strategies: A meta-analytic examination. *Psychological bulletin*, 143(4), 384.
- Pence P, Katz L, Huffman C, Cojucar G. (2014). Delivering integrative restoration-yoga nidra meditation (iRest®) to women with sexual trauma at a veteran's medical center: a pilot study. *International journal of yoga therapy*, 24(1), 53-62.
- Raisi F, Yahyavi S, Mirsepassi Z, Firoozikhajestefar R, Shahvari Z. (2018). Neglected sexual needs: A qualitative study in Iranian patients with severe mental illness. *Perspectives in psychiatric care*, 54(4), 488-494.
- Reffi A N, Pinciotti CM, Darnell BC, Orcutt HK. (2019). Trait mindfulness and PTSD symptom clusters: Considering the influence of emotion dysregulation. *Personality and individual differences*, 137, 62-70.
- Riccelli D, Williams JL. (2020). Shaping the Future of Addiction Recovery\_ Healing Trauma Through Mindful Movement in Group Settings.
- Schoorl M, Mil-Klinkenberg V, Van Der Does W. (2015). Mindfulness skills, anxiety sensitivity, and cognitive reactivity in patients with posttraumatic stress disorder. *Mindfulness*, 6(5), 1004-1011.
- Schouten KA, van Hooren S, Knipscheer JW, Kleber RJ, Hutschemaekers GJ. (2019). Trauma-focused art therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder: A pilot study. *Journal of Trauma & Dissociation*, 20(1), 114-130.
- Sharif Nia H, Kaur H, Fomani FK, Rahmatpour P, Kaveh O, Pahlevan Sharif S, Venugopal AV, Hosseini L. (2021). Psychometric properties of the impact of events scale-revised (IES-R) among general iranian population during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in psychiatry*, 1177.
- Steenkamp MM, Litz BT, Marmar CR. (2020). First-line psychotherapies for military-related PTSD. *JAMA*, 323(7), 656-657.
- Szoke DR, Hazlett-Stevens H. (2019). Mindfulness and Sexual Violence Handbook of Sexual Assault and Sexual Assault Prevention (pp. 469-484): Springer.
- Vaartio-Rajalin H, Santamäki-Fischer R, Jokisalo P, Fagerström L. (2020). Art making and expressive art therapy in adult health and nursing care: A scoping review. *International journal of nursing sciences*.
- Van der Kolk B. (2022). Posttraumatic stress disorder and the nature of trauma. *Dialogues in clinical neuroscience*, 2(1), 7-22.
- Van Lith T, Bullock L, Rahimian E, Moghaddam K. (2016). A landscape of art-based therapeutic practices in Iran. *Journal of Applied Arts & Health*, 7(1), 7-23.
- Vanloo-Rivard BP. (2020). Group Art Therapy Clinical Intervention Program for Black Women Who Experienced Sexual Trauma in Early Adulthood.
- Vasegh Rahimparvar SF, Mottaghi B, Daneshparvar H, Jafari A. (2015). The Study of Post-Traumatic Stress Disorder in Women Complaining of Rape Referred to Legal Medicine Center in Tehran in 2013. *Iranian Journal of Forensic Medicine*, 21(1), 47-52. (In Persian)

Walker MS, Kaimal G, Koffman R, DeGraba TJ. (2016). Art therapy for PTSD and TBI: A senior active duty military service member's therapeutic journey. *The arts in psychotherapy*, 49, 10-18.

Watkins LE, Sprang KR, Rothbaum BO. (2018). Treating PTSD: A review of evidence-based psychotherapy interventions. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 12, 258.

Weiss DS. (2007). *The impact of event scale: revised Cross-cultural assessment of psychological trauma and PTSD* (pp. 219-238): Springer.